


# PIOR DO QUE UM BURACO MACULAR...



Mário Ornelas, Inês Matias, Pedro Neves, David Martins

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

17 de fevereiro de 2018



HOSPITAL DA LUZ  
LISBOA

4º Simpósio  
de OCT

17 de fevereiro de 2018  
Auditório do Hospital da Luz Lisboa

Centro Hospitalar de Setúbal  
Hospital de São Bernardo  
Hospital Ortopédico Sant'Iago do Outão

# CASO CLÍNICO



- ↘ 73 anos
- ↘ Antecedentes Pessoais: 0
- ↘ Antecedentes Oftalmológicos: 0



## Motivo da consulta:


- Diminuição da AVOE ( $\pm$  1 mês de evolução)



- ↘ VOD 0.8 cc
- ↘ VOE 0.05 cc
- ↘ Catarata CN ODE
- ↘ **Buraco macular OE**



# CASO CLÍNICO

20 Março 2015




# CASO CLÍNICO



20 Março 2015



6 Maio 2015





**Faco + Lio + 23g + peeling MLI + SF6  
3 dias *face down***





# CASO CLÍNICO

20 días pós-op  
**AVOE 0.2**





2 meses pós-op  
**AVOE 0.4**





# CASO CLÍNICO

6 meses pós-op

AVOD 0.8





AVOE 0.6





# CASO CLÍNICO

1 ano pós-op

AVOD 0.8




AVOE 0.7



# CASO CLÍNICO

2 anos pós-op



# PIOR DO QUE UM BURACO MACULAR



- 75 anos
- Antecedentes Pessoais: 0
- Antecedentes Oftalmológicos: cirurgia de BM OE



## Motivo da consulta:

- Diminuição da AVOD ( $\pm$  2 meses de evolução)





- VOD 0.1 cc
- VOE 0.7 sc
- Catarata CN OD; Pseudofaquia OE
- **Buraco macular OD**



# CASO CLÍNICO

2 anos pós-op


AVOD 0.1



**Faco + Lio + 23g + peeling MLI + SF6**  
**3 dias *face down***





AVOE 0.7



# CASO CLÍNICO

20 dias pós-op  
**AVOE 0.3**



# DISCUSSÃO



- ↘ BM no olho adelfo em 13% dos doentes com BM aos 48m;
- ↘ Aos 24m, de 58 olhos adelfos sem DPV, 27 tiveram DPV e apenas 3 desenvolveram BM (11%);
- ↘ A presença de um DPV no olho adelfo é um factor de bom prognóstico;
- ↘ Intervenção precoce no OD? Ocriplasmina?
- ↘ Independentemente do prognóstico, o risco de BM no olho adelfo deve ser tido em conta na indicação cirúrgica;

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1996 Apr;234(4):241-5  
Semin Ophthalmol. 2003 Jun;18(2):58-66.  
Am J Ophthalmol. 2005 Sep;140(3):370-5

# CONCLUSÕES

- ↘ O OCT tem um papel fundamental na caracterização dos BM, na interpretação da sua patogénese, bem como na avaliação do olho adelfo;
- ↘ O OCT tem também um papel importante na escolha da técnica cirúrgica;
- ↘ Valor prognóstico e útil para monitorizar o pós-operatório;
- ↘ A cirurgia precoce do buraco macular está associada a uma melhor recuperação visual.

# OBRIQADO



Mário Ornelas  
mario.a.ornelas@gmail.com